
























Alle sollten ihren Impfschutz 6 Monate nach der Grundimmunisierung auffrischen lassen – insbesondere diese Personengruppen:

Personengruppe	Empfohlene Grundimmunisierung	Wann?	+	Empfehlung zur Auffrischungsimpfung mit einem mRNA-Impfstoff, egal mit welchem Impfstoff die Grundimmunisierung stattfand
 Ältere Menschen		 In der Regel ab 6 Monaten nach vollständiger Grundimmunisierung		1 Alle Bürgerinnen und Bürger 60 plus .
 Vorerkrankte/ Immungeschwächte		 In der Regel ab 6 Monaten nach vollständiger Grundimmunisierung		1 Bei einer stark ausgeprägten Immunschwäche sollte generell eine Optimierung der Grundimmunisierung ab 4 Wochen nach der letzten Impfung stattfinden. Über eine spätere Auffrischungsimpfung muss im Einzelfall entschieden werden. 2 Auch enge Kontaktpersonen von stark Immungeschwächten können nach 6 Monaten eine Auffrischungsimpfung erhalten.
 Pflegebedürftige		 In der Regel ab 6 Monaten nach vollständiger Grundimmunisierung		1 Diese Personengruppe beinhaltet auch Bewohnerinnen und Bewohner von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen und anderen gefährdeten Gruppen sowie Pflegebedürftige im eigenen Haushalt .
 Pflegekräfte und medizinisches Personal		 In der Regel ab 6 Monaten nach vollständiger Grundimmunisierung		1 Diese Personengruppe umfasst generell medizinisches und pflegerisches Personal, das einem erhöhten Coronavirus-Infektionsrisiko ausgesetzt ist .
 Personen, welche mit den Impfstoffen von Johnson & Johnson oder AstraZeneca geimpft wurden	 AstraZeneca + AstraZeneca  AstraZeneca + mRNA-Impfstoff  Johnson & Johnson	 In der Regel ab 6 Monaten nach vollständiger Grundimmunisierung  In der Regel ab 4 Wochen nach vollständiger Grundimmunisierung		1 Eine Auffrischungsimpfung ist sowohl bei einem homologen als auch einem heterologen Impfschema empfohlen. Wichtig zu wissen: Nach Ansicht der Ständigen Impfkommission (STIKO) ist eine einzelne Dosis des Impfstoffs Janssen® von Johnson & Johnson als Grundimmunisierung nicht ausreichend. Daher sollte zur Verbesserung der Wirksamkeit der Grundimmunisierung 4 Wochen nach der Erstimpfung ein mRNA-Impfstoff verabreicht werden.

● mRNA-Impfstoff ● Vektor-Impfstoff

Gut zu wissen: Grundsätzlich ist es nicht erforderlich, vor einer Auffrischungsimpfung einen Antikörpertest zu machen.